

Allgemeine Deutsche Rosenneuheitenprüfung (ADR)

**Boniturblatt**

ADR-Nr.: \_\_\_\_\_

Rosenklasse: \_\_\_\_\_

Kriterien / Merkmale	#	Höchst- punkte	Bewertungen						Mittelwert	Bemerkung	
			1. Flor			2. Flor					
<b>1. Prüfungsjahr/Datum</b>											
<b>Strauch</b>	Winterhärte	1 x	5		x	x		x	x	x	
	Wüchsigkeit	2 x	5	x		x		x		x	
<b>Blätter</b>	Widerstandsfähigkeit	6 x	35								
<b>Blüte</b>	Reichblütigkeit/Blühdauer	6 x	10								
	Duft	6 x	5								
	Selbstreinigung	4 x	5	x				x			
	UV-/Hitzetoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	Regentoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	<b>Gesamteindruck</b>	6 x	25								

**Summe der Mittelwerte des 1. Prüfungsjahres**  

bei Befall

Sternrußtau	x						
Mehltau	x						
Rost	x						
Sonstiges: _____	x						

**2. Prüfungsjahr/Datum**  

<b>Strauch</b>	Winterhärte	1 x	5		x	x		x	x	x	
	Wüchsigkeit	2 x	5	x		x		x		x	
<b>Blätter</b>	Widerstandsfähigkeit	6 x	35								
<b>Blüte</b>	Reichblütigkeit/Blühdauer	6 x	10								
	Duft	6 x	5								
	Selbstreinigung	4 x	5	x				x			
	UV-/Hitzetoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	Regentoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	<b>Gesamteindruck</b>	6 x	25								

**Summe der Mittelwerte des 2. Prüfungsjahres**  

bei Befall

Sternrußtau	x						
Mehltau	x						
Rost	x						
Sonstiges: _____	x						

**3. Prüfungsjahr/Datum**  

<b>Strauch</b>	Winterhärte	1 x	5		x	x		x	x	x	
	Wüchsigkeit	2 x	5	x		x		x		x	
<b>Blätter</b>	Widerstandsfähigkeit	6 x	35								
<b>Blüte</b>	Reichblütigkeit/Blühdauer	6 x	10								
	Duft	6 x	5								
	Selbstreinigung	4 x	5	x				x			
	UV-/Hitzetoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	Regentoleranz	2 x	5	x		x		x		x	
	<b>Gesamteindruck</b>	6 x	25								

**Summe der Mittelwerte des 3. Prüfungsjahres**  

bei Befall

Sternrußtau	x						
Mehltau	x						
Rost	x						
Sonstiges: _____	x						

<b>Summe der MW 1. - 3. Jahr</b>	<b>Mittelwert "Gesamt"</b>	<b>Mittelwert "Gesundheit"</b>
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

**Bonitur der ADR-Rosen und Abstimmungskandidaten an allen Standorten zum Abschluss der Prüfung:**

durchschnittliche Pflanzenhöhe: _____ cm	<u>Wuchsform:</u>	ggf. abweichende Rosenklasse: _____
durchschnittliche Pflanzenbreite: _____ cm	aufrecht	
Trieblänge niederliegende Sorten: _____ cm	breitbuschig	
	überhängend	
	niederliegend	

## Erläuterungen zur Bonitur

### Winterhärte

- 1 Bonitur / Jahr nach Rückschnitt und Neuaustrieb (April/Mai), wobei Schäden durch Spätfröste nicht erfasst werden.
- Im 1. Jahr erfolgt keine Triebbonitur: Note „5“ oder Feld leer lassen (d.h. alle ausgefallen).
- Ab 2. Jahr wird nach Anzahl betroffener Triebe bewertet:
  - 0 Punkte: Ausfall aller Pflanzen
  - 1 Punkt: sehr starke Frostschäden
  - 2 Punkte: starke Frostschäden
  - 3 Punkte: mittlere Frostschäden
  - 4 Punkte: leichte Frostschäden
  - 5 Punkte: keine bis sehr leichte Frostschäden

### Wüchsigkeit

- 2 Bonituren / Jahr (jeweils zum Höhepunkt des 1. und 2. Flors).
- Die Wüchsigkeit muss der groben Rosenklasse (Kl , [Str, Beet, Klstr.], Zwerg) entsprechen.
- Weicht der beobachtete Rosentyp von der Anmeldung ab, wird dies dem Koordinator bei Ergebnisübermittlung mitgeteilt.
- Stärkerer Wuchs wird nicht negativ bewertet.
- Die Wüchsigkeit einer Sorte wird im Vergleich zu allen anderen Rosensorten am Standort im selben Jahr bewertet.
- Positiv: starker Neuaustrieb nach Rückschnitt
- Negativ: kümmerlicher Wuchs
- Ungleichmäßige Triebverteilung wird im Gesamteindruck bewertet

### Widerstandsfähigkeit

- 6 Bonituren / Jahr (Bonituren / Flor)
- Pilzliche Erkrankungen jeder Art führen zu Punktabzug.
- Beobachtete Krankheiten (Sternrußtau, Echter Mehltau, Rost, Angabe sonstiger Krankheiten) werden dem Koordinator bei der Ergebnisübermittlung mitgeteilt.
- Insektenschäden haben keinen Einfluss auf die Bewertung (können aber ggf. negativ in den Gesamteindruck eingehen).

### Reichblütigkeit/Blühdauer

- 6 Bonituren / Jahr (3 Bonituren / Flor)
- Es gibt unterschiedliche Blühzeitpunkte. Die Bewertung wird sortenspezifisch zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt.
- Die Bewertung erfolgt für jede Sorte und jeden Flor über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen.
- Alle Prüfgärten führen einen Sommerschnitt durch.
- Die Blühdauer der Einzelblüten ist nicht relevant.
- Die Bewertung erfolgt nur im Vergleich zu Sorten des gleichen Rosentyps\* und gleicher Blütenfüllung (un-/halb-/gefüllt).

### Duft

- 6 Bonituren / Jahr (3 Bonituren / Flor)
- Die Bonituren erfolgen bei unterschiedlichen Wetterbedingungen und Tageszeiten.
- Es findet keine Bewertung des Duftes statt (angenehm/störend) und es erfolgt keine Analyse der Duftkomponenten.
- Es wird nur die Duftintensität bewertet:
  - 0 Punkte: fehlend
  - 1 Punkt: sehr leicht
  - 2 Punkte: leicht
  - 3 Punkte: mittel
  - 4 Punkte: intensiv
  - 5 Punkte: sehr intensiv

### Selbstreinigung

- 4 Bonituren / Jahr (2 Bonituren / Flor)
- Mumienbildung führt zu Punktabzug

### UV-/Hitzetoleranz

- 2 Bonituren / Jahr (1 Bonitur / Flor)
- Verbrennen und UV- / Hitzebedingte Farbveränderung (d.h. Verblauen bei roten Sorten) führen zu Punktabzug.

### Regentoleranz

- 2 Bonituren / Jahr (1 Bonitur / Flor)
- Fleckenbildung und Verkleben der Petalen führen zu Punktabzug.

### Gesamteindruck

- 6 Bonituren / Jahr (3 Bonituren / Flor)
- Der Gesamteindruck ist die Summe aller Merkmale und Eigenschaften.
- Es werden dabei nur Sorten des gleichen Rosentyps\* und gleicher Blütenfüllung (un-/halb-/gefüllt) verglichen.

\* Rosentyp: Rosenklasse (Kl , [Str, Beet, Klstr.], Zwerg), *R. persica*-Hybride